

Protocolli di applicazione adattabili alla stagionalità nelle varie regioni d'Italia:

Protocollo A - fase PRIMAVERILE (prevenzione)

Indicazioni:

- periodo: febbraio, marzo, aprile (in assenza di melari);
- posizionare contemporaneamente sia BARRiVEA™ da interno che da esterno;
- frequenza: 1 o 2 applicazioni settimanali a seconda del grado di infestazione;
- durata del trattamento: fino al posizionamento dei melari.

Procedura:

1. fornirsi di BARRiVEA™ variante esterna ed interna;
2. applicare la composizione RiVEA™ sulle setole di entrambe i modelli di BARRiVEA™ utilizzare la spatola (in dotazione) per distribuire uniformemente la composizione sulle setole;
3. collocare le BARRiVEA™ una all'ingresso/uscita dell'alveare e una all'interno dello stesso in posizione centrale (tra i telai di covata);
4. pulire il cassetto e ungerlo di olio di semi per bloccare una eventuale risalita della Varroa nell'arnia;
5. ripetere dopo 4 o 7 giorni consecutivi a seconda della gravità della situazione;
6. al rinnovo del trattamento, rimuovere delicatamente il prodotto residuo sulle setole delle BARRiVEA™ con la spatola in dotazione;
7. controllare la caduta di Varroa nel cassetto ripulito ad ogni nuova applicazione e unto con olio di semi, in modo da bloccarne l'eventuale risalita nell'arnia;
8. se varroa > 20 esemplari/giorno: ripetere subito il trattamento;
- se varroa < 10 esemplari/giorno: una applicazione settimanale;

9. se varroa < 5 esemplari/giorno: una applicazione settimanale della sola BARRiVEA da esterno fino al posizionamento dei melari.

Protocollo B - fase ESTIVA (in eventuale presenza di melari)

Indicazioni:

- periodo: estate (in presenza di melari)

Procedura:

1. nella fase estiva non sarebbe necessario intervenire nel caso sia stato eseguito il protocollo A;
2. a seconda dei casi, si potrà valutare di effettuare un trattamento singolo nella pausa che intercorre tra il prelievo del melario riempito e sigillato e il posizionamento di uno nuovo da riempire, utilizzando contemporaneamente le due BARRiVEA™, interna ed esterna, vedi metodo di applicazione al paragrafo;
3. nel caso in cui ci si trovasse di fronte ad una situazione drammatica e si decidesse comunque di posizionare i melari, si potrebbe applicare il protocollo A anche nella fase estiva una volta alla settimana utilizzando solo BARRiVEA™ interna posizionata nella parte centrale (tra i telai della covata)

Protocollo C - fase AUTUNNALE (post produzione in assenza di melari)

Indicazioni:

- Periodo: da settembre a dicembre (post produzione in assenza di melari)

Procedura:

ripetere la procedura del protocollo A.

Protocollo C - fase INVERNALE (mantenimento)

Indicazioni:

- periodo: invernale dicembre - gennaio (nei mesi più freddi in assenza di melari);
-

- frequenza: 1 applicazione ogni 15 giorni;
- in condizioni meteo: favorevoli possibilmente giornate soleggiate;
- durata del trattamento: 6-8 settimane (3-4 applicazioni).

Procedura:

1. munirsi di BARRiVEA™ variante interna;
2. applicare composizione RiVEA™ sulle setole;
3. sollevare delicatamente il coprifavo dell'alveare per 2-3 cm circa;
4. inserire lentamente la barra BARRiVEA™ tra i telai centrali;
5. abbassare il coprifavo;
6. pulire il cassetto e spalarlo di olio di semi;
7. lasciare BARRiVEA™ in posizione per 3-5 giorni;
8. estrarre la barra, rimuovere delicatamente la polpa residua con la spatola in dotazione;
9. controllare la caduta di Varroa nel cassetto ripulito ad ogni nuova applicazione e unto con olio di semi in modo da bloccarne l'eventuale risalita nell'arnia.

Pulizia e ricondizionamento della barra BARRiVEA™

Al termine del ciclo di utilizzo, dopo aver tolto i residui di RiVEA™ con la spatola in dotazione, passare delicatamente con un panno caldo umido per pulire le setole e lasciar asciugare. Conservare BARRiVEA™ in un luogo asciutto. BARRiVEA™ è riutilizzabile fino a che le setole restano integre e la sua struttura intatta.

Composizione: purea di mela, acido L-ascorbico (vitamina C), acqua filtrata e remineralizzata oli essenziali di Verbenone, Tea Tree, Timo,